


UNA INTERESANTE LOCALIDAD DESAPARECIDA DE *XEROTRICHA*  
(*CASTELLANA*) *PARABARCINENSIS* ORTIZ DE ZÁRATE, DEL  
LLANO DE BARCELONA. (MOLLUSC. PULMON.)

por Luis Gasull

*Helicella (Xerotricha) parabacinensis* Ortiz de Zárate, A. 1946.

Especie poco conocida que fue descubierta y descrita por Ortiz de Zárate con ejemplares por él mismo recolectados, de la localidad de *Monistrol de Montserrat*, ladera norte de la estación del ferrocarril; especie que pasó desapercibida o equivocada con otras especies de concha parecida, del grupo de las *barcinensis* Bgt., aunque de anatomía muy diversa.



El autor la incluye en el subgénero (sección) *Castellana*, que comprende las *Xerotricha*, con la concha lampiña, desprovista de vello, y con un reborde blanco en el interior del peristoma.

La localidad a que me refiero en esta nota, está localizada al norte del Llano de Barcelona, de superficie reducida, una loma conocida por el *Turó de la Creueta del Coll*, en su ladera norte, sobre la carretera del Valle de Hebrón, terreno silício, vegetación herbácea bastante pobre, y en la que en 29 3 48 recolecté muchos ejemplares adultos, vivos que el mismo Ortiz de Zárate identificó en su anatomía, y conchas vacías, de las que figuran 121

ejs. en mi colección. Esta localidad en la actualidad ha sido totalmente urbanizada y edificada y no pude hallar rastro de esta especie en posteriores visitas.

Mis ejemplares dan una media de 5 y  $3/4$  de vueltas de espira, una fuerte escultura, y coloración variable, en forma de bandas, una superior ancha, y otra menos ancha inferior, acompañadas de una o dos más interiores muy delgadas.

El ej. figurado en esta nota, mide Diám. 8,2 y Alt. 5,9 mm. y puede ser considerado como un ejemplar de medidas medias de esta colonia, pero el mayor ej. mide Diám. 8,9 y Alt. 6,5 mm. y el menor Diám. 6,5 y Alt. 4,6 mm.

Conocemos esta especie de muy pocas localidades, comprobadas anatómicamente, pero la hallé en una localidad de la provincia de Valencia, y 5 localidades de la provincia de Alicante, y en 3 yacimientos cuaternarios de la última provincia. El Prof. E. Gittenberger, de Leiden, identificó la especie, por su estudio anatómico, de una de las localidades de Alicante.

## BIBLIOGRAFIA

- 1946 ORTIZ DE ZARATE, A.—Observaciones anatómicas y posición sistemática de varios Helicidos españoles. Especies recogidas en Cataluña.  
Bol. R. Sdad. Esp. Hist. Nat., 44, pp. 337-356.
- 1975 GASULL, L.—Fauna malacológica terrestre del Sudeste Ibérico.  
Bol. Sdad. Hist. Nat. Baleares, 20. En prensa.